



## **METADONI JA SUBUTEX**

Metadoni on opiaattivieroituksessa ja korvaushoidossa käytettävä pitkäkestoinen opiaattivalmiste. Metadoni ja Subutex eivät sovi yhteen. Niiden yhdistäminen lyhyin väliajoin aiheuttaa vieroitusoiret.

Jos olet ottanut metadonia, odota vähintään 24 tuntia, ennen kuin otat Subutexia.

Jos olet ottanut Subutexia, odota vähintään 20 tuntia, ennen kuin otat metadonia.

Subutexin hoidollinen annostus on hyvin yksilöllistä. annosten vaikutukset voivat vaihdella huomattavasti monista tekijöistä johtuen. Näitä tekijöitä ovat esim. riippuvuuden aste, aineiden käytön kesto, yleiskunto, elämäntilanne ja hoitomotivaatio. Subutexista vieroittaudutaan pienentämällä annoksia asteittain ohjeiden mukaisesti. Subutex EI aiheuta huumaantunutta oloa eikä euforian tunnetta annostusta lisättäessä.

### **Lisätieto: Terveysneuvontapiste Portti**

Avoinna: Tiistaisin ja Torstaisin klo 16–18,  
Vuorikatu 31-33, puh. 017-183696

Lähde: Suomen Huumehaittojen Minimointi ry ja Helsingin Terveysneuvontapiste Vinkin tekemä esite, Marraskuu 1999

Tietoa tarkistettu:  
Kuopion päihdepalvelusäätiö, lokakuu 2006

# Subutexin Käyttö

Tietoa  
huumeidenkäyttäjille  
buprenorfiinin  
käytöstä  
aiheutuvien riskien  
välttämiseksi